

Aus dem Pathologischen Institut der Universität Erlangen
Direktor Prof. Dr. Eugen Kirch.

über das Vorkommen von eisenfreiem braunen Pigment
(Abnutzungspigment) in den 3 großen Mundspeicheldrüsen

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Zahnheilkunde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von

Thea Schmidt

appr. Zahnärztin aus Nürnberg.

Tag der mündlichen Prüfung: 30. März 1931.

Buchdruckerei Karl Döres, Erlangen, Jägerstraße 3
Telefon 2521

Referent: Prof. Dr. Eugen Kirch.

Dekan: Prof. Dr. Konrad Schübel.

Meinen lieben Eltern.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Im Rahmen einer am Erlanger pathologischen Institut in Gang befindlichen, größeren Untersuchungsreihe über die pathologische Anatomie der großen Mundspeicheldrüsen bei Mensch und Versuchstier wurde auch der Frage einer Pigmentierung dieser Organe die Aufmerksamkeit geschenkt.

Es fiel mir auf Veranlassung von Herrn Prof. Dr. E. Kirch eine Aufgabe zu, an einer größeren Anzahl von Mundspeicheldrüsen, die dem laufenden Sektionsmaterial des Instituts entnommen wurden, Untersuchungen über endogene Pigmentablagerungen in Parotis, Submaxillaris und Sublingualis anzustellen — insbesondere über die Häufigkeit und Entstehungsbedingungen dieser Pigmentierung, über ihre genaue Lokalisation und ihr mikrochemisches Verhalten.

Es ist in der einschlägigen Literatur über derartige Befunde an Speicheldrüsen nur sehr wenig berichtet worden. Meist handelt es sich dabei nur um mehr nebenbei erwähnte Zufallsbefunde in Arbeiten, die verwandte Gebiete betreffen, also um spärliche Notizen, die im allgemeinen der Grundlage einer genaueren und systematischen Untersuchung ermangeln.

So berichtet bereits im Jahre 1877 Quincke (5) in seiner Arbeit „über Siderosis“, einem Beitrag für eine Festschrift, „dem Andenken A. von Haller gewidmet“, über derartige Beobachtungen. Er schreibt von einer „kaffeebraunen Pigmentierung der Speicheldrüsen bei dieser ihrem Wesen nach nicht geklärten Stoffwechselstörung“. Einige Jahre später (1895) werden durch die Arbeit eines Schülers von Lubarsch, K. Hintze (6), weitere Beobachtungen dieser Art bekannt. In seiner Arbeit „über Hämochromatose“ beschreibt er auch die Veränderungen an den Mundspeicheldrüsen bei Hämochromatose und berichtet, neben eisenhaltigem auch eisenfreies Pigment in diesen Organen gefunden zu haben. Späher will er es in den Epithelzellen selbst beobachtet haben, in Mand- und Korbzellen“, „nicht selten aber auch in den mehr zylinderförmigen Drüsenepithelien“. Auch in den Bindegewebszellen des Interstitiums will er eisenfreies neben eisenhaltigem Pigment gesehen haben. An der Deutung dieser Befunde hegt E. J. Lang (1) einige Zweifel und er wirft die Frage auf, ob Hintze (6) über-

haupt eisenfreies Pigment von eisenhaltigem Pigment unterscheiden konnte, da er das Eisen doch noch nicht mit der Turnbullblaureaktion nachweisen konnte.

Auch Solger (11) hat ein goldgelbes Pigment, und zwar in den Speichelrohrepithelien, beobachtet. Er glaubte, daß das Vorkommen dieses Pigmentes als Ausdruck lebhaften Stoffumsatzes aufzufassen sei. Aber er konnte nichts Näheres über die Natur dieses Pigments aussagen.

Eine erst im Jahre 1928 erschienene Arbeit von K. Bork (7) „zur Lehre von der allgemeinen Hämochromatose“ nimmt abermals Stellung zu dieser Frage: Bork (7) fand nämlich „ziemlich reichlich braunes Pigment in den Epithelien der Sekretröhrchen“. „Histochemisch verhält sich das braune Pigment in den glatten Muskelfasern und Bindegewebszellen Sudan gegenüber ausnahmslos negativ. Mit Nilblau färbt es sich wie das gewöhnliche Abnutzungspigment bläulich bis bläulichgrün“.

Eingehender haben sich erstmalig mit dieser Frage der Pigmentierung von Speicheldrüsen zwei Japaner befaßt, als sie umfangreiche Untersuchungen über die verschiedenen pathologischen Veränderungen an diesen Organen anstellten.

Kurosawa (3) (1922) und Yamaguchi (2) (1925) gaben je eine Arbeit heraus, die beide den gleichen Titel führten: „Studien über die Mundspeicheldrüsen.“

Bei der Behandlung der Fettverhältnisse in den Mundspeicheldrüsen geben beide Autoren übereinstimmend ziemlich genaue und klare Untersuchungsergebnisse bekannt, die sie aus einem größeren Sektionsmaterial gewonnen hatten.

Kurosawa (3) beobachtete goldgelbe grobkörnige oder auch schollige Pigmente in den Epithelien der Speicheldrüse und in Ausführungsgangepithelien. Er konstantierte immer, hinsichtlich ihrer Lagerung, eine innige Beziehung zum Zellkern. Er fand es vermehrt in höherem Lebensalter und bei gewissen Krankheiten besonders bei malignen Tumoren. Das Pigment zeigte Lipoidreaktion. Kurosawa (3) hielt das fetthaltige Pigment für Lipofuscin.

In der Sublingualis beobachtete Kurosawa (3) in den Korbzellen gelblich braune Pigmentkörner, die den Zelleib bis in die Protoplasmafortsätze ausfüllten. Dieses Pigment färbte sich nach diesem Autor schwer mit Sudan III, aber leicht und intensiv mit Nilblausulfat, es konnte durch dreiprozentige Wasserstoffsuperoxydlösung nicht gebleicht werden.

Yamaguchi (2) gibt im wesentlichen die gleichen Ergebnisse bekannt wie Kurosawa (3). Er fügt jedoch noch hinzu, daß er das Pigment in den Stäbchenepithelien gefunden habe. Er hält

as Pigment auf Grund seines histochemischen Verhaltens und der begleitenden Umstände, unter welchen es auftritt, zur Gruppe der Benutzungspigmente gehörig. Ueber das Korbzellenpigment macht er die gleichen Angaben wie Kurosawa (3) und läßt mit ihm die Frage offen, in welche Gruppe dieses Pigment einzureihen sei.

Wenn ich nunmehr zu meinen eigenen Untersuchungen übergehe, so standen mir dafür etwa fünfzig Fälle zur Verfügung, die dem Sektionsmaterial des Instituts fortlaufend entnommen wurden. Auch wurden dabei von vorneherein kindliche Fälle ausgeschaltet und ältere Individuen zahlenmäßig etwas bevorzugt.

Die zu untersuchenden Drüsen wurden zu diesem Zweck in Gelatine eingebettet und die gewonnenen Gefrierschnitte teils mit Mämatoxylin-Eosin, und teils mit Sudan III gefärbt.

Von diesen 50 geprüften Fällen wurden nur diejenigen für eine eingehendere histologische und mikrochemische Untersuchung ausgewählt, bei denen der Nachweis von Pigment in den vorläufigen Schnitten geglückt war, insgesamt 15 Fälle.

An Färbeverfahren wurden bei diesen 15 pigmenthaltigen Fällen angewandt: Berliner-Blau-Reaktion und zum Teil auch die Turnbullblaureaktion zum Nachweis etwaigen Eisengehaltes, außerdem Färbungen mit Sudan III, Scharlachrot und Nilblausulfat, des Weiteren Versuche einer Versilberung mit Argent. nitr. und einer Färbung mit 3prozentigem Hydrogenium peroxydatum.

Nachstehend sei nun eine eingehende Beschreibung aller Einzelbefunde bei den untersuchten Fällen gegeben. Beigefügt habe ich jeweils den Fällen eine Angabe über Hauptleiden und Todesursache sowie Ernährungszustand der betreffenden Individuen.

Fall 1: 69jährige Frau, Sektionsnummer 205/30. Hauptleiden und Todesursache: Blande Nephrosklerose. Hypertrophie und Dilatation des linken Herzens. Ausgedehnte und starke Arteriosklerose; frischer Hirnerweichungsherd in dem rechten Ammanglion. Ernährungszustand: sehr gut.

Submaxillaris.

Die Drüse zeigt eine starke Fettgewebsdurchwachsung, die das ganze Organ gleichmäßig durchzieht. Das Fettgewebe beträgt ungefähr $\frac{1}{5}$ des Parenchyms. Die Drüse ist in ihrer Gesamtheit etwas atrophisch. Die Ausführungsgänge sind klein und haben geringes Lumen. Im übrigen sind die Ausführungsgänge teils leer, teils enthalten sie amorphe Massen, teils aber schollige Einlagerungen verschiedener Größe, letztere mit Eosin gut färbbar. Man

findet starke Arterio- und Arteriolsklerose mit weitgehender Verengerung des Lumens. Stellenweise sind ganz geringe Zellinfiltrate zu finden, vorwiegend lymphocytärer Art.

Auffallend ist eine goldgelbe bis bräunliche, scheinbar diffuse Farbstoffeinlagerung in den zylindrischen Epithelien der Sekretoröhren. Von dieser Pigmentierung sind nahezu alle Ausführungsgänge — und zwar in ihrer Gesamtheit — betroffen. Nicht so hochgradig ist die Pigmentierung mit dem gleichen Farbstoff eines Teiles der serösen Drüsen. Bei dieser Pigmentierung der serösen Drüsen fällt auf, daß meist nur einzelne Zellen, anscheinend wohl isoliert, betroffen sind, während gleiche benachbarte Zellen derselben Drüsenformation nur geringgradig oder gar nicht pigmentiert sind. Völlig unbeteiligt sind die mukösen Drüsen.

Die Eisenreaktion (Berliner-Blaureaktion) fällt negativ aus. Sudan III verleiht dem goldgelben Pigment eine bräunlich gelbe Tönung mit einem Stich nach rot. Nilblausulfat färbt das abgelagerte Pigment dunkelblau. Besonders zu betonen ist hier, daß diese Färbung zahlreichste, feinste Pigmentkörnchen hervortreten läßt, wo bei den vorhergehenden Färbemethoden eine diffuse Verteilung des Pigmentes vorgetäuscht war. Versilberung mit Argentum nitricum hat eine schwache Nachdunklung des goldgelben Farbtönen zur Folge. Bleichung des Pigmentes mit 3%igem Hydrogenium peroxydatum ist nicht sicher möglich gewesen.

Fall 2: 72jährige Frau, Sektionsnummer 191/30. Hauptleiden und Todesursache: Rektumcarzinom. Herzinsuffizienz. Mäßigstarke Atherosklerose der Aorta. Ernährungszustand gut.

Parotis.

Das Fettgewebe dieser Drüse beträgt nur ungefähr $\frac{1}{10}$ des Gesamtorganes. Es ist gleichmäßig über die Drüse verteilt. Man findet eine mittlere, ja stellenweise sogar hochgradige Atrophie der serösen Drüsenepithelien. Diese serösen Drüsen sind stellenweise fein fettbestäubt, an anderen Stellen ist das Fett in feinen Tröpfchen aufgelagert. Die Drüsenausführungsgänge weisen keine Besonderheiten auf. Einige von den intralobulär gelegenen sind schwach fettbestäubt. Die Lumina der Ausführungsgänge sind mit einem amorphem Inhalt angefüllt. Veränderungen an den Gefäßen sind nicht sehr ausgeprägt. Arterien und Arteriolen weisen geringgradige Wandverdickungen auf. Verfettung der Gefäße ist nicht zu beobachten. Um einige größere Ausführungsgänge herum finden sich dichtzellige Infiltrate.

In den Epithelien vereinzelter seröser Drüsen beobachtet man ein braungelbes Pigment in undeutlicher Form. Dabei sind in

en nur wenige der serösen Zellen betroffen und hier besonders penförmig beisammenstehende Zellen. Noch etwas deutlicher die Epithelien einzelner Sekrettröhrchen in gleicher Weise entiert. Die Epithelien der Schaltstücke sind ebenfalls pigmentiert. In den Ausführungsgängen ist nichts Sicheres von Pigment nachweisbar.

Die angestellte Eisenreaktion fällt negativ aus. Bleichung mitigem Hydrogenium peroxydatum ist nicht deutlich. Nilblausulfat das beobachtete goldgelbe Pigment dunkelblau und läßt nunliche Körnerform erkennen. Das Neutralfett der Fettgewebshwachung färbt sich gleichzeitig schön rot.

Sublingualis.

Die Glandula sublingualis zeigt eine wesentlich stärkere Veränderung als die entsprechende Glandula parotis des gleichen Falles. Verhältnis von Parenchym: Fett beträgt etwa 2:1. Von einer Hypertrophie der Drüsenepithelien kann man nicht eigentlich sprechen, stellenweise scheinen sie etwas klein zu sein. Die serösen Drüsen sind etwas fettbestäubt, während die mukösen Drüsen frei sind. Die Epithelien der Drüsenausführungsgänge sind ebenfalls ganz leicht verfettet. In ihrem Lumen enthalten Ausführungsgänge Sekret ohne Zellbeimischung. An Arterien und Arteriolen treten keine deutlichen Veränderungen auf. Veränderungen sind kaum vorhanden. Auf den ersten Blick scheint Pigment zu fehlen. Bei genauerem Suchen findet es sich doch deutlich an mehreren Stellen und zwar anscheinend in serösen Drüsen. Manchmal erfüllt es die halbmondförmigen Zellen vollständig in Form feiner Körner von brauner Farbe. In anderen Drüsen ist es blasser, mehr hellgelb, nicht deutlich konturiert, und vornehmlich in einander benachbarten serösen Zellen vorhanden. Im ganzen ist das Pigment nur spärlich vorhanden. An den Sekrettröhren ist nichts Sicheres von Pigmenteinlagerungen nachweisbar. In mukösen Zellen ist auch nichts Verdächtiges vorhanden. Eisenreaktion ist negativ. Bei Nilblausulfatfärbung tritt insgesamt nur spärliche Pigment wenig in Erscheinung.

Fall 3: 67jährige Frau, Sektionsnummer 196/30. Hauptleiden und Todesursache: Magencarcinom mit Metastasen. Begleitend starke Aortensklerose. Ernährungszustand: gut.

Submaxillaris.

Die Fettgewebsdurchwachung ist nicht klar ausgedrückt. Sie greift peripher der einzelnen Lobuli an und setzt sich mit Fettzellen und Haufen in die Läppchen fort. Das Drüsen-

parenchym ist geringgradig atrophisch, die Epithelien darin weisen eine staubfeine Verfettung auf, die in den serösen Halbmonden allerdings etwas stärker ist als in den übrigen Drüsen. Die Arterien zeigen keine Veränderungen, die Arteriolen jedoch deutliche Hyalinisierung (starke Arteriosklerose.) Intralobulär finden sich mäßig reichliche Infiltrate, auch in den Läppchen, weniger in interlobulären Zwischengewebe.

Die Epithelien vereinzelter Sekretröhrchen und Schaltstücke zeigen deutliche Braunfärbung, herrührend von einer scheinbar diffusen Farbstoffeinlagerung. Auffallend ist, daß die Pigmentierung der Sekretröhren an Stärke vielfach wechselt, und daß die Ausführungsgänge anscheinend völlig frei davon sind. Teilweise ist das Pigment mehr lumenwärts, teilweise mehr basal, teilweise scheinend gleichmäßig über die Zelle verstreut.

Die angestellte Eisenreaktion fällt völlig negativ aus. Nilblausulfat färbt den goldbraunen Farbstoff dunkelblau und läßt gleichzeitig erkennen, daß wir in diesem Pigment sehr feine Körnchen vor uns haben. Im Drüsenparenchym hat sich nichts Sicheres von Pigment nachweisen lassen.

Sublingualis.

Es finden sich vorwiegend muköse, stellenweise aber auch sehr reichlich seröse Drüsen beigemischt. Fettzellen sind fast in gleicher Menge wie in der zugehörigen Unterkieferdrüse vorhanden, auch ihre Anordnung ist ähnlicher Art. Das Parenchym ist stellenweise mittelgradig, im allgemeinen aber nur wenig atrophisch. Einige Zellen der Ausführungsgänge sind fettbestäubt bis klebtropfig verfettet. Die Arterien zeigen nichts Auffallendes, die Arteriolen sind ähnlich hyalin sklerosiert wie in der Submaxillaris, wenn auch in wechselnder Stärke. Infiltrate sind mehr intralobulär in einzelnen Läppchen vorhanden und dort ziemlich diffus verteilt. In den meist leeren, größeren Ausführungsgängen zeigt sich, wenn der dem Lumen zugekehrten Seite etwas kleintropfige Verfettung

Spuren eines goldgelben Pigmentes in grobkörniger Form sind in ganz vereinzelter serösen Zellen zu finden. Durch die Pigmenteinlagerung kommt die Halbmondform solcher Zellen besonders deutlich zu Tage. Merkwürdig ist, daß die Halbmonden, soweit sie das Pigment enthalten, dieses auch in relativ reichlichem Maße aufweisen, während die große Masse der übrigen Zellen gar nichts davon zeigt, geringgradige Anfangsstadien der Pigmentierung also nirgends zu erkennen sind. Einige der Ausführungsgänge haben hier und da einen leicht bräunlichen Schimmer, das ist sicheres Pigment nicht nachzuweisen.

Fall 4: 71jährige Frau, Sektionsnummer 182/30 Haupt- und Todesursache: Diabetes. Mäßig starke Arteriose. Herzdilatation. Lungenödem. Ernährungszustand: ziert.

Parotis

Besonders auffallend an der Drüse ist der überaus starke Fettgehalt. Das Fettgewebe ist bezüglich seiner Ausdehnung nur 4 mal so stark als das Drüsenparenchym. Die Zellen des Drüsenparenchyms scheinen fein fettgestäubt, doch ist die genaue Entscheidung schwierig, da die massenhaften Fettzellen der Drüsenzellen im Schnittpräparat vielfach überdeckt haben. Die Ausführungsgänge sind in geringerem Grade an der Fettsetzung beteiligt. Das Drüsenparenchym ist etwas atrophisch, nicht sehr deutlich und auffallend. Das Lumen einzelner Ausführungsgänge ist angefüllt mit einem amorphen Inhalt, die übrigen sind ohne Inhalt. Die Veränderungen an den Gefäßen sind nicht sehr ausgeprägt. Die mittleren Arterien sind etwas verengt und haben stellenweise kleintropfige Fetteinlagerungen. In den Arteriolen keine Veränderungen. Zellige Infiltrationen sind nur in Spuren vorhanden und zwar in unmittelbarer Umgebung der Ausführungsgänge.

Pigment ist am sezernierenden Epithel nicht feststellbar. Epithelien der Sekrettröhrchen zeigen hie und da einen leicht gelblichen Schimmer, doch kann nicht sicher von einer Pigmentierung gesprochen werden. — Eisenreaktion fällt negativ aus.

Submaxillaris.

Die Glandula submaxillaris ist nicht so sehr fettreich wie die Parotis des gleichen Falles. Immerhin beträgt das Verhältnis von Parenchym zu Fett noch etwa 2:1. Die Fettzellen folgen hauptsächlich den breiten, bindegewebigen Septen. Sie durchdringen aber auch die Läppchen des Parenchyms und zerschneiden dieses in viele kleine Inseln. Die Drüsenepithelien sind fein fettgestäubt bis gröber verfettet. Die Epithelien der Ausführungsgänge gut sichtbar fettbestäubt. Drüsenepithelien und Epithelien der Ausführungsgänge gering atrophisch. Die Ausführungsgänge teilweise mit amorphem Inhalt erfüllt, teilweise mit abgegrenzten Epithelien, wieder andere enthalten größere Schollen. In den Gefäßen geringgradige Wandverdickung. Keine Verfettung. Bindegewebigen Septen sind zum großen Teil durchtrennt, zum Teil zersetzt durch Fettgewebe. In vielen intralobulären Räumen befinden sich reichlich Lymphocyten, die teils diffus,

teils herdförmig auftreten. Die intralobulären Interstitien halbzellreiches Bindegewebe.

Die Epithelien mehrerer Drüsenausführungsgänge erscheinen deutlich goldgelb bis bräunlich-gelb verfärbt. Eine Körnelung des Pigmentes ist zunächst nicht erkennbar. Es findet sich nur in den Sekret Röhren und Schaltstücken, in den Sekret Röhren anscheinend überall, wenn auch nicht durchweg gleich stark, dagegen nicht in den Ausführungsgängen. Besonders deutlich sichtbar ist die Pigmentierung, wenn verzweigte Sekret Röhren im Präparat längs geschnitten sind. Im übrigen Parenchym ist diese Einlagerung nicht zu finden. Berliner-Blaureaktion fällt negativ aus. Nilblausulfat läßt eine Einlagerung von feinkörnigem Pigment erkennen und färbt es dunkelblau. 3%iges Hydrogenium peroxydatum bräunt das Pigment nach 24 stündiger Einwirkung fast völlig zum Schwarzen. Argentum nitricum dunkelt das Pigment nicht eigentlich, läßt es nur deutlich in Erscheinung treten.

Fall 5: 74 jährige Frau, Sektionsnummer 184 30. Hautleiden und Todesursache: Alte Peritonitis, Dünndarmfisteln, Marasmus. Mäßigstarke Atherosklerose an der Aorta und Coronararterien. Ernährungszustand: stark reduziert.

Submaxillaris.

Die Fettzellen, die etwa $\frac{1}{3}$ des Gesamtorgans ausmachen, sind einzeln, kettenförmig und in Haufen angeordnet, im ganzen diffus verteilt. Daneben besteht eine mittelgradige Atrophie des Parenchyms. Drüsenepithelien und Epithelien der Ausführungsgänge sind leicht fettbestäubt. An den Arterien und Arteriolen nur geringe, nicht sehr deutliche Wandverdickung, aber keine Verfettung. Stellenweise finden sich um größere Ausführungsgänge herum fleckförmig angeordnete Infiltrate; aber im ganzen sind doch nur mäßig Infiltrate vorhanden. In den Ausführungsgängen liegt manchmal etwas Sekret, in anderen amorphe Massen, wieder in anderen weniger abgestoßene Epithelien und ziemlich viele polymorphkernige Leukozyten.

Recht deutlich sichtbar ist eine kräftige, bräunliche Verfärbung der Epithelien mehrerer Sekret Röhrchen, in weniger starkem Maße auch einiger seröser und ganz selten der relativ spärlichen mukösen Drüsen. Das Pigment läßt nur selten Körnelung erkennen, meist scheint es das Gewebe diffus zu durchsetzen. In den Epithelien der serösen Drüsen aufgefundene Pigmentierung scheint heller als das Pigment in den Sekret Röhrchen des gleichen Präparates. In den Epithelien der serösen und mukösen Drüsen kann man innige Beziehungen des Pigmentes bezüglich seiner Lage zum Zellkerne beobachten. Die Eisenreaktion verhält

gativ. Mit Nilblausulfat läßt sich das Pigment dunkelblau, jedoch nicht so blau wie üblich, färben und gleichzeitig läßt diese Färbung nun feinste Pigmentkörnchen erkennen.

Keine Schwärzung des Pigmentes mit *Argentum nitricum* wird damit lediglich ein stärkeres Hervortreten des Pigmentes bewirkt. 3%iges *Hydrogenium peroxydatum* bewirkt nach 24 stündiger Einwirkung eine starke Bleichung des braunen Pigmentes.

Fall 6: 82jährige Frau, Sektionsnummer 155/30. Hauptleiden und Todesursache: Arterio- und arteriiosklerotische Nierenschwundniere. Starke Herzhypertrophie. Ausgedehnte und starke Arteriosklerose. Bronchopneumonie. Ernährungszustand: stark reduziert.

Parotis.

Neben einer starken Fettgewebsentwicklung, die ungefähr bis $\frac{1}{4}$ des Drüsengewebes ausmacht, ist eine deutliche mittelgradige Atrophie vorhanden. Eine Verfettung ist an den Ausführungsgängen und in den Drüsenepithelien nicht erkennbar. An den Arteriolen nur ganz geringgradige Veränderungen, auch nur ganz schwache Verfettung erkennbar. An den Arterien keine Veränderungen. Die größeren und mittleren Ausführungsgänge haben einen mit Eosin gut färbbaren, kernlosen Inhalt, einige von ihnen sind mit Infiltrate nur ganz wenig vorhanden.

Wegen seines geringen Grades findet man ein bräunliches Pigment erst bei sehr starker Vergrößerung, eingestreut vorwiegend in die Epithelien der Sekretröhren. Die kleinsten Sekretröhren sind anscheinend sämtlich betroffen. Selten findet man das Pigment in den serösen Zellen des Parenchyms, doch ist es hier so spärlich, daß man es erst nach längerem Suchen finden kann. Das Pigment ist überhaupt zunächst nicht sehr deutlich sichtbar, da seine Farbe etwas blaß ist; hat man es jedoch erst einmal gesehen, so findet man es immer wieder, gleichmäßig über das Präparat verteilt. Die Sekretröhren sind nicht immer in ihrer Gesamtheit betroffen. Häufig beherbergen es nur einzelne Epithelien. Es scheint zunächst diffus eingelagert und zwar mehr in den dem Lumen abgewandten Teilen der Epithelien. Oefter trifft man es um Zellkerne herum angehäuft.

Dieses Pigment gibt keine Eisenreaktion. Doch färbt es sich sehr deutlich tief dunkelblau mit Nilblausulfat. Es ist feinkörnig. Mit 3%igem *Hydrogenium Peroxydatum* läßt sich das Pigment zum Schwinden bringen. *Argentum nitricum* bewirkt ein stärkeres Hervortreten der bräunlichen Farbe des Pigmentes.

Fall 7: 71jähriger Mann, Sektionsnummer 62/30. Hauptleiden und Todesursache: Magencarcinom mit Metastasen Marasmus. Ernährungszustand: sehr schlecht.

Submaxillaris.

Das Parenchym der Drüse nur mäßig verfettet, stärker die bindegewebigen Septen. Die gesamten serösen und auch mukösen Drüsen sind kleintropfig verfettet. Ebenso sind die Epithelien der Drüsenausführungsgänge deutlich, meist kleintropfig verfettet. Das Drüsenparenchym ist stellenweise deutlich atrophisch, die serösen Bestandteile darin besonders deutlich. Ein Teil der Ausführungsgänge ist mit Sekret, der übrige Teil mit amorphen Inhalt erfüllt. Um einige Ausführungsgänge herum geringfügige Zellinfiltrate. Die Gefäße sind mäßig stark verfettet. Wandverdickung geringeren und mittleren Grades findet man an den Arterien, etwas stärkere Verdickung an den Arteriolen.

Die Sekretröhren weisen eine deutliche, scheinbar diffuse Pigmentierung mit einem bräunlichen Farbstoff auf. Sehr selten findet man das Pigment in einzelnen serösen Drüsen wieder, nie dagegen in mukösen Drüsen. Besonders schön sichtbar ist das Pigment in mehreren längsgeschnittenen Sekretröhren. Meist sind diese Sekretröhren in ihrer Gesamtheit pigmentiert. Oefters jedoch liegen die Körnchen an einzelnen Stellen in dichten Haufen, während benachbarte Epithelien nichts enthalten. Hier und da läßt sich eine ausgesprochene Lagerung in den lumenwärts gelegenen Teilen der Epithelien feststellen, an anderen Stellen dagegen wird die periphere Lokalisation bevorzugt — an wieder anderen Stellen ist der braune Farbstoff rings um den Zellkern gelagert. Es fällt auf, daß der Farbstoff stellenweise hellgelb, fast zitronenfarben erscheint, an anderen Stellen dagegen deutlich dunkler, rehbraun bis schokoladebraun. Eisenreaktion negativ. Nilblausulfat färbt das Pigment dunkelblau und läßt Körnerform erkennen.

Fall 8: 75jähriger Mann, Sektionsnummer 68/30. Hauptleiden und Todesursache: Periproktale Phlegmone. Ausgebreitete Arteriosklerose von wechselnder Stärke. Geringe Arterio- und arteriolosklerotische Schrumpfnieren. Keine sichere Herzhypertrophie. Hirnerweichungsherd. Ernährungszustand: mittel.

Parotis.

Ziemlich stark verfettete Drüse. Das Fettgewebe ist über Interstitium und gesamtes Drüsenparenchym ziemlich gleichmäßig verteilt. Die Drüsenläppchen sind mittelmäßig atrophisch. Die

Gefäßwände mäßig stark verdickt. In den Epithelien der Sekret-röhren liegt relativ reichlich goldbraunes Pigment. Es fällt vielfach schon bei schwacher Vergrößerung auf. Nur geringe Pigmentierung, die erst nach längerem Suchen bei starker mikroskopischer Vergrößerung erkennbar wird, in serösen Drüsen.

Die Eisenreaktion verläuft negativ. Nilblausulfat färbt das Pigment dunkelblau. Es zeigt das Pigment in Form feiner Körner, läßt es dagegen in den serösen Drüsen fast kaum hervortreten.

Submaxillaris.

Die Drüse ist reichlich stark verfettet. Die Fettzellen, vorwiegend reihenförmig angeordnet in Anlehnung an die Bindegewebssepten, nehmen etwa $\frac{1}{5}$ des Parenchyms ein, das als solches leicht atrophisch erscheint, wenigstens die serösen Zellen darin. Das Drüsenparenchym ist zum Teil kleintropfig verfettet bis fettbestäubt, die Sekret-röhrchen sogar erheblich kleintropfig verfettet. Das Lumen der Ausführungsgänge enthält etwas amorphe Masse, nur wenig abgestoßene Epithelien. Die Gefäße zeigen mittelmäßig starke Veränderungen. Eine Verdickung der Intima an den Arterien ist sehr deutlich, nicht so ausgesprochen an den kleineren Gefäßen. Zellige Infiltrate finden sich fast gar nicht.

Nahezu alle Sekret-röhren sind bräunlich pigmentiert — viele sind in ihrer Gesamtheit betroffen, andere dagegen nur in einzelnen Epithelien Pigment. In vielen liegt das Pigment mehr lumenwärts, in anderen jedoch durchsetzt es die einzelne Epithelzelle ganz gleichmäßig. Der bräunliche Farbton in den Sekret-röhren fällt schon bei ganz schwacher Vergrößerung auf. Die Ausführungsgänge sind vollkommen frei davon. Selten erkennt man Körnchen im Pigment, meist erscheint es diffus gelagert. Anscheinend völlig unbeteiligt sind die relativ spärlichen mukösen und die gesamten serösen Drüsen. Bei Färbung mit Nilblausulfat erkennt man deutliche Pigmentkörnchen, die sich mit diesem Farbstoff dunkelblau färben. Eisenreaktion fällt negativ aus. Sudan III verleiht dem Pigment einen intensiv gelblich-braunen, leicht nach rot hinüberspielenden Farbton.

Sublingualis.

Die Glandula sublingualis ist nur mäßig stark verfettet. Das Verhältnis von Parenchym : Fett beträgt etwa 6 : 1. Das Parenchym zeigt geringgradige Atrophie, die vorwiegend die serösen Drüsen betrifft. An den Ausführungsgängen findet man keine atrophischen Veränderungen. Das Parenchym ist an der

Verfettung beteiligt, und zwar vorwiegend die atrophischen serösen Drüsenepithelien. Ebenso sind die Ausführungsepithelien feintropfig bis staubfein verfettet. Sie enthalten wenig Sekret gelegentlich amorphe Masse. An den Gefäßen, sowohl an Arterien wie Arteriolen nur mittelmäßige Wandverdickung. Um verschiedene Sekretröhren herum geringe lymphocytäre Infiltrate, die von hier aus in das eigentliche Drüsenparenchym einsprossen.

Sicheres Pigment ist nicht nachzuweisen.

Fall 9: 71jährige Frau, Sektionsnummer 114/30. Hauptleiden und Todesursache: Diabetes. Duraendothelium über dem linken Stirnhirn. Geringe Atheromatose an Aorta- Coronar- und Hirngefäßen. Geringe recurrierende Mitral- und Aortenendocarditis. Ernährungszustand: sehr fettreich.

Parotis.

Die ganze Drüse ist außerordentlich stark mit Fettgewebe durchsetzt. Von den bindegewebigen Septen aus sproßt das Fettgewebe in das Drüsenparenchym hinein und zersetzt das Drüsengewebe in viele kleine, scheinbar unzusammenhängende Partien. Jedenfalls überwiegt an Masse bei weitem das Fettgewebe über das Drüsengewebe. Die restlichen Parenchyminseln sind außer dem stark atrophisch. Die Epithelien der Ausführungsgänge scheinen fettbestäubt zu sein. Die mittleren Gefäße zeigen geringe Wandverdickung, aber keine Verfettung. An den Ateriolen keine Veränderungen. Um die mit amorphen Massen gefüllten Ausführungsgänge liegen deutliche lymphocytäre Infiltrate, die auch intralobulär an den Ausführungsgängen vorhanden sind und im Verhältnis zu dem spärlichen Parenchym als reichlich zu bezeichnen sind. Man hat hie und da den Eindruck, daß an den Sekretröhren und einzelnen serösen Drüsen eine ganz leichte bräunliche Tönung vorliegen könnte, doch hat sich trotz längerer Suchens nirgends sicheres Pigment nachweisen lassen.

Sublingualis.

Die Fettgewebsdurchwachsung ist für eine Sublingualis recht stark, tritt aber, als absolute Menge genommen, weit hinter der zugehörigen Parotisdrüse zurück. Das Verhältnis von Parenchym : Fettgewebe ist ungefähr 5 : 1, doch nicht immer gleichmäßig. In dem leicht atrophischen Drüsengewebe sind die serösen Zellen deutlich verfettet. Die fettbestäubten Drüsenausführungsgänge zeigen keinen besonderen Inhalt. An den Gefäßen keine Veränderungen. Infiltrate sind mäßig reichlich interlobulär aber auch intralobulär in Form fleckförmig angeordneter Lymphocyten vorhanden. Darunter finden sich vereinzelte Leucocyten.

Bei starker Vergrößerung findet man ein etwas blasses, schmutzig bräunliches Pigment. Es ist enthalten in einzelnen serösen Drüsen, wesentlich häufiger dagegen in serösen Halbmonden. Im ganzen ist es doch ziemlich reichlich in der Drüse vorhanden, da es in sehr vielen Zellen, wenn auch jeweils nur in Spuren auftritt. Nirgends zeigt das Pigment den sonst beobachteten mehr leuchtend gelblich braunen Farbton. Die Halbmonde lassen vielfach gerade durch ihren stärkeren Pigmentgehalt ihre Form besonders deutlich hervortreten und man sieht dann, daß die jeweils entsprechenden mukösen Drüsen völlig frei davon sind. Überhaupt enthalten im vorliegenden Fall nirgends die mukösen Drüsen Pigment und auch nirgends die Ausführungsgänge. Bemerkenswert ist noch, daß die vorhandenen serösen Drüsen meist neben der Pigmentierung eine besonders deutliche Atrophie zeigen.

Die Eisenreaktion verlief ergebnislos. Obwohl es aus anderen Gründen nicht möglich war, die übrigen mikroskopischen Untersuchungsmethoden anzuwenden, handelt es sich wohl in diesem Fall um braunes Abnutzungspigment!

Fall 10: 75-jähriger Mann, Sektionsnummer 112/30. Hauptleiden und Todesursache: Metastasierendes Pankreascarcinom. Tumorkachexie. Atrophisches Herz. Geringe Atrophie der Milz und Nieren. Ernährungszustand schlecht.

Submaxillaris.

Die Drüse hat sehr viele muköse Zellen, die in einzelnen Gruppen sogar überwiegen. Die serösen Bestandteile, und zwar die Halbmonde, sind fettbestäubt; in vielen Zellen besteht daneben eine feintropfige Verfettung, die an den Ausführungsgängen bis zu kleinen Tropfen zunimmt. Das Parenchym ist leicht atrophisch. Es finden sich darin reichlich lymphocytäre Infiltrate, die überwiegend um Sekrettröhrchen herum, die mit amorphem Inhalt gefüllt sind, liegen. An den Arterien keine klaren Veränderungen. Die Arteriolen zeigen stellenweise Verquellung der Innenschicht. In den Epithelien vieler Sekrettröhrchen findet sich eine Ablagerung eines bräunlichen Pigmentes, das man erst nach sorgfältigster Untersuchung findet. Selten durchsetzt es die jeweils betroffenen Sekrettröhrchen in ihrer Gesamtheit, gewöhnlich nur einzelne Epithelien erfüllt. Eine ausgesprochene Lagerung am Lumenwärts ist nicht deutlich. Das Pigment ist scheinbar gleichmäßig verteilt. In den Epithelien der Sekrettröhrchen ist es nicht ganz gleichmäßig nachweisbar, wenn man auch hier und da den Eindruck hat. An einer Stelle fand sich das Pigment außerdem in zwei

nebeneinander gelegenen serösen Drüsen. Das Pigment lag nahe an den Zellkern gedrängt. Nie fand sich das Pigment in mukösen Drüsen.

Eisenreaktion ist negativ. Eine weitere Untersuchung der Pigmentes mit den übrigen mikroskopischen Reaktionen ist aus äußeren Gründen nicht möglich gewesen. Doch handelt es sich sicher auch bei diesem Pigment um braunes Abnutzungspigment.

Sublingualis.

Nur spärlich Fettgewebe. Großtropfige Verfettung vorwiegend in den Septen. Im Drüsenparenchym mehr kleintropfige Fettgewebe trennt öfters den Zusammenhang der Drüsenläppchen. Vereinzelte muköse Drüsen etwas kleintropfig verfettet, stärker dagegen die serösen Drüsen. Auch die Drüsenausführungsgänge sind kleintropfig verfettet bis fettbestäubt. In einigen Ausführungsgängen finden sich abgestoßene Epithelien, selten Sekret, öfters amorphe Massen. Eine Atrophie der Drüsenepithelien ist nicht deutlich zu erkennen. An den Gefäßen die gleichen geringgradigen Veränderungen wie in der zugehörigen Submaxillaris. Infiltrate finden sich um einige kleinere Ausführungsgänge herum. Sie scheinen lymphocytärer Art zu sein. Diese Infiltrate sprossen von ihrem Hauptzentrum um den Ausführungsgang herum in das umliegende Drüsengewebe hinein und durchziehen es ziemlich ausgedehnt.

Pigment findet sich ebenfalls, jedoch in etwas anderer Verteilung. Es betrifft hauptsächlich einige der serösen Halbmonde, wenn auch nicht alle. Dabei ist an solchen Halbmonden entweder mehr oder weniger deutliche Atrophie vorhanden; speziell sind solche Zellen dann sehr schmal, etwa sichelförmig. Teilweise füllt es in braungelber Farbe die Zelle ganz und liegt hier offenbar recht dicht. An den Ausführungsgängen ist das Pigment in Spuren vorhanden, denn ihre Epithelien zeigen vielfach einen leicht bräunlichen Schimmer. Bis zu deutlicher Pigmentierung ist es aber noch nicht gekommen. Die Ausführungsgänge zeigen nichts von Pigmentierung. Desgleichen alle mukösen Drüsen. Die Eisenreaktion fällt durchweg negativ aus.

Fall 11: 46jähriger Mann. Sektionsnummer 211/30. Hauptleiden und Todesursache: Kehlkopfcarcinom. Erstickenstod durch Larynxödem. Mäßig starke Stauungsorgane. Alter geheilter Spitzentb. Ernährungszustand: mittel.

Submaxillaris.

Drüse von gehörigem Bau, Drüsenläppchen gut ausgebildet, ebenso Drüsenausführungsgänge. Nur ganz mäßige Verfettung.

er Drüse. Einzelne größere Fettzellen sind über die ganze Drüse verteilt. Ein kleiner Teil der serösen Drüsen ist fein fettbestäubt. Ausführungsgänge und Sekretröhren sind durchwegs fettbestäubt, ja teilweise feintropfig verfettet. Ausführungsgänge sind erfüllt mit reichlich abgestoßenen Epithelien. Um viele Sekretröhren herum finden sich mäßig viel Infiltrate lymphocyter Art. Diese Infiltrate erstrecken sich von hier aus hinein in das Drüsenparenchym, zwischen die einzelnen Drüsenläppchen. In den Gefäßen keine Veränderungen außer einer ganz schwachen, fast nicht mehr wahrnehmbaren Verfettung.

In ganz vereinzelt serösen Drüsen liegt ein goldgelbes Pigment. Vereinzelte Sekretröhren zeigen einen etwas bräunlichen Schimmer, der Pigment vermuten, es aber nicht klar in Erscheinung treten läßt.

Sublingualis.

Gut ausgebildete Drüse mit großen Drüsenläppchen und breiten, kräftigen Bindegewebssepten. Einige Sekretröhren sind erfüllt mit etwas abgestoßenen Epithelien. Selten ist Sekret darin enthalten. Um mehrere Ausführungsgänge herum mäßig viel lymphocytaire Infiltrate! Die Verfettung des Organs ist nicht sehr stark. Größere Fettgewebszellen begleiten die Bindegewebssepten, und vereinzelt über das eigentliche Drüsenparenchym verstreut, kleinere Fettzellen zersetzen das Parenchym. Relativ seltener als die serösen Drüsen sind die mukösen Drüsen und Halbmonde fettbestäubt. Sekretröhren nicht so deutlich verfettet wie in der gehörigen Submaxillaris.

Nur wenig lymphocytaire Infiltrate! An den Gefäßen keine Veränderungen. Sehr reichlich ist das Drüsenparenchym mit dem leuchtenden zitronen- bis goldgelben Pigment durchsetzt. Besonders reichlich findet sich dieses Pigment in den serösen Drüsenepithelien der Glandula sublingualis und in ihren serösen Halbmonden. Oft hat es die Form feiner Körnchen, häufiger aber doch mehr schollige Form, manchmal scheint es die Epithelien diffus durchzusetzen. Bezüglich seiner Lage zeigt es innige Beziehung zum Zellkern. Das Pigment ist ausserordentlich reichlich vorhanden, da es in einigen Lobuli annähernd in jeder Zelle enthalten ist, wenn auch jeweils nur in Spuren. Auch in den mukösen Drüsen ist das Pigment eingelagert. Hier erkennt man häufig deutlich eine Lagerung in den peripheren Teilen der befreiten Drüsen in unmittelbarer Nähe des Zellkernes. Die Drüsenausführungsgänge sind nur ausnahmsweise diffus durchsetzt. Dabei ist klar erkennbar, daß das Pigment mehr in den nach unten gelegenen Teilen liegt.

Die Eisenreaktion verändert das Pigment nicht. Mit Sudan III nimmt es einen etwas gelblich-roten Ton an. Mit Nilblausulfat färbt es sich dunkelblau mit einem etwas grünlichen Schimmer. 3%iges Argentum nitricum läßt das Pigment etwas nachdunkeln. Hydrogenium peroxydatum bleicht seine Farbe etwas.

Fall 12: 54jähriger Mann, Sektionsnummer 154/30 Hauptleiden und Todesursache: Hochgradige Peritonealtuberkulose. Braune Atrophie des Herzens und der Leber. Allgemeine Arteriosklerose des Gefäßsystems. Chronische Leptomeningitis. Hirnödeme. Ernährungszustand: mäßig.

Parotis

Drüse von normalem Bau, Drüsenläppchen annähernd von gehöriger Größe, Ausführungsgänge entsprechend groß und weit. Mittelmäßige Fettgewebstdurchwachsung. Größere Fettzellen längs der Bindegewebsssepten, und verstreut über das gesamte Drüsenparenchym. Die Epithelien sind häufig fein mit Fett bestäubt, die Epithelien der Ausführungsgänge kleintropfig verfettet und feinst bestäubt. Im Lumen der Ausführungsgänge mittelmäßig viel amorpher, geschliffene Epithelien. An den Gefäßen findet man keine Veränderungen außer einer ganz geringgradigen Verfettung. Einige mittlere Gefäße leicht fettgestäubt. Spuren eines goldgelben bis bräunlichen Pigmentes findet man an den verschiedenen Stellen des Präparates in einzelnen nahe beieinander liegenden serösen Zellen. Es ist im ganzen nur sehr spärlich vorhanden, findet sich nie in den Epithelien der Sekrettröhren,

Submaxillaris

Die Drüse ist gut gebaut, seröse und muköse Drüsenepithelien entsprechend groß, ebenso die Ausführungsgänge. Mittelmäßig starke Durchwachsung der Drüse längs der Septen und im Parenchym mit Fettgewebe. In einigen Ausführungsgängen findet sich amorpher Inhalt, in Sekrettröhren und Schaltstücken nur wenig Sekret und nur Spuren von abgestoßenen Epithelien. Um wenige Ausführungsgänge herum nur geringe lymphocytäre Infiltrate. An den Gefäßen keine erkennbaren Veränderungen. Viele Sekrettröhren und Schaltstücke sind deutlich bräunlich pigmentiert. Das Pigment scheint die betroffenen Epithelien diffus zu durchsetzen. Die Schaltstücke und Sekrettröhren sind fast immer in ihrer Gesamtheit mit Pigment durchsetzt. Das Pigment ist häufig ausgesprochen lumenwärts gelagert. Weniger deutlich findet es sich in den Epithelien vereinzelter seröser Drüsen, hauptsächlich vorzugsweise peripher gelagert. Nie in mukösen Drüsen. — Dr.

Pigment gibt keine Eisenreaktion, Nilblausulfat färbt das Pigment deutlich dunkelblau und läßt Körnerform erkennen. Mit 3% igem *Argentum nitricum* tritt es lediglich etwas deutlicher in Erscheinung.

Sublingualis.

Drüsenläppchen von entsprechendem Bau. Bindegewebssepten gehörig breit. Im ganzen nur recht mäßig Fettgewebe. In den Drüsenausführungsgängen finden sich reichliche Massen abgestoßener Epithelien und nur wenig Sekret. Infiltrate sind kaum vorhanden. Die Gefäße weisen keine Veränderungen auf. Recht reichlich findet sich ein kräftig braunes Pigment vorwiegend in den serösen Halbmonden. Im ganzen sicher mehr als in der vorgenannten Drüse. Da die Halbmonde in ihrer Gesamtheit von diesem Pigment erfüllt sind, erscheinen sie deutlich sichelförmig. Eine Körnelung des Pigments ist kaum erkennbar. Auch in den rein serösen Drüsenschläuchen findet man das Pigment. Die Epithelien der Ausführungsgänge enthalten gar nichts von Pigment, auch nicht die mukösen Drüsenepithelien

Fall 13: 65jähriger Mann, Sektionsnummer 253/30. Hauptleiden und Todesursache: Blasenpapillomatose. Dilatation des linken Ventrikels. Lungenödem. Ernährungszustand gut.

Parotis.

Die Drüse ist im allgemeinen gut gebaut — die einzelnen Drüsenläppchen entsprechend groß, höchstens vereinzelt etwas klein, aber nicht sehr deutlich. Das Fettgewebe ist stellenweise recht stark. Die Epithelien der serösen Drüsen sind fast durchwegs kleintropfig verfettet oder auch nur wenig fettbestäubt. Ebenso sind die Epithelien der Ausführungsgänge fettbestäubt bis kleintropfig verfettet. Die Sekretröhren und Schaltstücke sind an der Verfettung stärker beteiligt, als die Ausführungsgänge. An den Gefäßen keine deutlichen Veränderungen. Einzelne sind geringgradig verfettet. Den Inhalt der Ausführungsgänge machen teilweise Massen abgestoßener Epithelien — teilweise etwas Sekret — und teilweise eine homogene gut mit Eosin färbbare Masse aus. Die Bindegewebssepten sind relativ breit und kräftig. In einigen Septen finden sich nur mäßig viel entzündliche Infiltrate in nächster Nähe der Ausführungsgänge.

Sehr deutlich sichtbar ist ein bräunliches Pigment, das die Epithelien vieler Sekretröhren durchsetzt. Es findet sich jedoch überhaupt nicht in den Ausführungsgängen. Eine deutliche Körnelung läßt das Pigment zunächst nicht erkennen, es scheint mehr

diffus eingelagert zu sein. Die Sekretröhren sind häufig in ihrer Gesamtheit mit Pigment erfüllt. Nie findet man das Pigment in serösen Drüsen.

Eisenreaktion negativ! Mit 3%igen Hydrogenium peroxydatur nach 24 Stunden Bleichung unsicher. In einem Teil der Schläuche scheint es abgeblaßt, in einem anderen Teil ist eine solche Wirkung nicht zu erkennen. Keine Veränderung des Pigmentes mit Argentinum nitricum. Nilblausulfat färbt das Pigment sehr deutlich dunkelblau und läßt Pigmentkörner erkennen.

Fall 14: 78jähriger Mann, Sektionsnummer 222/30. Hauptleiden und Todesursache: Polymorphkerniges Sarkom der rechten Gesichtshälfte, ausgehend von der Nase. Metastase der rechten Nebenniere. Herz- und Kreislaufinsuffizienz. Kachexie. Altersatrophische Leber, altersatrophische Nieren. Ernährungszustand: mittel.

Parotis.

Die mäßig atrophische Drüse ist sehr stark verfettet. Das Fettgewebe übertrifft an Masse ganz beträchtlich das noch vorhandene Parenchym. Das Fettgewebe durchsetzt das ganze Parenchym und teilt es in viele kleine Parenchyminseln auf. Die etwa kernarmen Bindegewebssepten scheinen teilweise verschmälert. Das Drüsenparenchym und die Epithelien der Ausführungsgänge fett bestäubt bis kleintropfig verfettet. Im Lumen der Ausführungsgänge findet sich etwas amorpher Inhalt. Keine Zellinfiltrate. An den Gefäßen gut sichtbare hyaline Verdickung der Intima. Pigment nicht vorhanden.

Submaxillaris.

Diese Drüse läßt sich zunächst überhaupt nicht als gemischte Drüse diagnostizieren, da sie nur sehr spärlich muköse Zellen enthält. Die Drüse ist in ihrer Gesamtheit etwas atrophisch. Das Bindegewebe um die Sekretröhren und Ausführungsgänge ist deutlich hyalinisiert. An den Ausführungsgängen selbst keine deutliche Atrophie. Die Fettgewebsdurchwachsung der Drüse ist sehr stark. Fettgewebszellen durchsetzen das gesamte Organ, über Läppchen und Septen gleichmäßig verteilt. Die Drüsenzellen sind durchweg fett bestäubt, sehr häufig kleintropfig verfettet, in gleicher Weise die Epithelien der Ausführungsgänge. Mehrere Sekretröhren sind vielfach deutlich dunkelbraun pigmentiert. Diese Sekretröhren sind fast immer in ihrer Gesamtheit betroffen, während nur vereinzelt lediglich in einzelnen Epithelien das Pigment enthalten. Meist liegt das Pigment in einander benachbarten Sekretröhren. Eine aus-

gesprochene lumenwärts gelegene Pigmentierung ist häufig deutlich. Das Pigment findet sich aber auch in einigen serösen Zellen, in nächster Nähe der pigmentierten Sekrettröhen. Hier erscheint seine Farbe etwas blasser, häufig bleibt nur ein bräunlicher Schimmer über den betreffenden Zellen. In den sehr spärlichen mukösen Drüsen war das Pigment nicht zu finden.

Die Eisenreaktion negativ. Nilblau-Sulfat positiv.

Sublingualis.

Die Glandula sublingualis ist nicht so fettreich wie die entsprechende Glandula submaxillaris. Das Fettgewebe begrenzt die Drüsenläppchen, setzt sich dann in feineren Fettröpfchen in das interlobuläre Bindegewebe fort. Die mukösen Zellen selbst sind selten fettbestäubt, nur manchmal kleintropfig verfettet. Im übrigen sind sie von gehörigem Bau. Die Ausführungsgänge sind fast gar nicht verfettet. Keine Veränderungen an den Gefäßen außer einer geringgradigen Verfettung. Um einzelne interstitiell gelegene Ausführungsgänge mäßig Zellinfiltrate lymphocytärer Art. In den Ausführungsgängen meist amorpher Inhalt. Ein kräftig braun gefärbtes Pigment in Form kleinerer und größerer Körner liegt an mehreren Stellen in serösen Halbmonden. Außerdem findet es sich noch in mehreren kleineren Ausführungsgängen, anscheinend diffus verteilt.

Eisenreaktion negativ. Nilblausulfat färbt das Pigment dunkelblau.

Fall 15: 67jähriger Mann, Sektionsnummer 232/30. Hauptleiden und Todesursache: Chronisches Lungenödem bei Mitralinsuffizienz. Konfluierende Bronchopneumonie rechts mit Pleuritis fibrinosa. Braune Atrophie des Herzens. Senile Atrophie der Nieren. Ernährungszustand kachektisch.

Submaxillaris.

Geringe bis mittelgradige Atrophie der Drüse, die muköse und seröse Drüsen in gleicher Weise betrifft. Ausführungsgänge und Sekrettröhen sind etwas eng und klein. In ihrem Lumen findet sich öfters eine homogene, leicht mit Eosin färbbare Masse, ohne erkennbare Zellbeimischung. Bindegewebssepten erscheinen etwas schmal. An den Arterien mäßige Intimaverdickungen, zum Teil etwas Verfettung. Arteriiosklerose mit deutlicher hyaliner Quellung. Verfettung an den Arteriolen fehlt meist. Die Drüse ist meist mäßig verfettet. In den Bindegewebssepten mehr großtropfige Verfettung, das Drüsenparenchym ist durchwegs kleintropfig verfettet, oder auch nur bestäubt. Die serösen Drüsen

sind deutlich stärker getroffen als die mukösen. Zellinfiltrate sind fast gar nicht vorhanden. Pigment ist nur schwer nachweisbar. Man findet es erst nach eingehendster Prüfung in den Epithelien ganz weniger Sekrettröhen. Manchmal äußert es sich überhaupt nur in einem leicht bräunlichen Schimmer, der über den betroffenen Sekrettröhen liegt. Es handelt sich um geringe Anfangsstadien von Pigment.

Es läßt sich mit Nilblausulfat färben. Eisenreaktion ist negativ. Mit 3%igem Hydrogenium peroxydatum kommt das Pigment zum Schwinden.

Wie aus den genauen Untersuchungsbefunden dieser insgesamt 15 pigmenthaltigen Fälle hervorgeht, war es leider nicht immer möglich in jedem einzelnen Fall alle drei Drüsen zu verarbeiten. Es stand im ganzen für die Untersuchung

7 mal die Parotis

12 mal die Submaxillaris

8 mal die Sublingualis

zur Verfügung; insgesamt waren es also 27 Drüsen.

Alle 3 Drüsen konnten untersucht werden in drei Fällen je 2 Drüsen in 6 Fällen — nur je 1 Drüse in 6 Fällen.

8 Fälle stammten von männlichen Individuen, 7 Fälle von weiblichen Individuen.

Die Verteilung auf das Alter der betreffenden Verstorbenen ist folgende:

1 Fall auf das 9. Jahrzehnt

8 Fälle " " 8. "

4 " " " 7. "

1 Fall " " 6. "

1 " " " 5. "

Die untersuchten Fälle stammen somit vorwiegend aus dem Senium und Präsenium, nur ganz wenige von Individuen mittleren Jahre (Fall 11 = 46 jähriger Mann, Fall 12 = 54 jähriger Mann), überhaupt keine von sehr jungen Individuen.

Das verarbeitete Material habe ich in einer Tabelle zur besseren Uebersichtlichkeit und zur leichteren Erkennung etwaiger Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten zusammengefaßt.

Es ist ferner nötig die übrigen untersuchten Fälle mit in Erwägung zu ziehen, die keinen Pigmentbefund ergaben, um einen Rückschluß auf die Häufigkeit des Vorkommens von Pigment überhaupt ziehen zu können. Auch diese Fälle stammten vorwiegend aus höherem Alter, besonders viele davon aus dem 7. Jahrzehnt; mehrere standen erst im mittleren Lebensalter, einen sogar erst im 3. Jahrzehnt.

Versucht man aus diesen Zusammenstellungen einen Rück-
 schluß auf die ungefähre Häufigkeit des Pigmentes in Speichel-
 drüsen überhaupt zu ziehen, so muß man doch sagen, daß das
 Pigment relativ häufig in diesen Organen vorkommt. Wenn
 unter rund 50 untersuchten Fällen, unter welchen sich allerdings
 besonders viele in senilem und praesenilem Alter befinden, nicht
 weniger als 15 Fälle Pigment enthielten, so bedeutet das nahezu
 ein Drittel des untersuchten Materials.

Die Menge des Pigmentgehaltes war in den untersuchten
 Fällen und wiederum in den einzelnen Drüsen dieser Fälle recht
 verschieden. Es waren Drüsen mit Pigment in geringsten
 Mengen, oft fast nur noch als bräunlicher Schimmer über den
 Drüsen sichtbar, bis zu Drüsen mit stärkster Pigmentierung, wo-
 in einzelnen Lobuli annähernd das ganze Parenchym Pigment
 enthielt, zu beobachten.

Weiterhin ist es nötig zu berücksichtigen, wie sich der Pig-
 mentgehalt auf die Drüsen verteilt. Untersucht wurde im ganzen
 12 mal die Parotis (Fall 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14,), 12 mal die Sub-
 maxillaris (1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, —15) und 8 mal die Sublingualis
 (3, 8—12, 14).

Von den 7 untersuchten Parotis-Drüsen enthielten das Pig-
 ment einwandfrei 5 Drüsen (Fall 2, 4, 6, 8, 12). Außerdem war
 in Fall 9 Pigment nicht sicher nachweisbar. Ueberhaupt nichts
 an Pigment enthielt nur eine der untersuchten Ohrspeicheldrü-
 sen, nämlich in Fall 14.

Die 12 untersuchten Glandulae submaxillares enthielten
 durchweg Pigment.

Von den 8 untersuchten Glandulae sublinguales enthielten
 7 Drüsen Pigment. In dem restlichen Fall 8 war Pigment nicht
 sicher nachzuweisen.

Es ergibt sich somit eine 100% ige Beteiligung der Glandula
 submaxillaris an der Pigmentierung, sofern überhaupt ein
 Pigmentgehalt in einer Mundspeicheldrüse nachweisbar ist. Etwas
 zurück steht dagegen die Glandula sublingualis, die unter 8 unter-
 suchten Fällen einen negativen Fall enthielt, sowie die Parotis,
 die unter 7 Fällen je einen negativen und einen fraglichen Fall
 aufzuweisen hat.

Wenn man auch noch graduelle Unterschiede der Pigmen-
 tierung innerhalb der einzelnen Drüsen berücksichtigt, so ergeben
 sich nachfolgende Verhältnisse: In der Parotis fand ich reichli-
 ches Pigment nur einmal und zwar in Fall 8, geringe Pigmentie-
 rung 2 mal (Fall 2 u. 6), nur in Spuren vorhandenes Pigment
 einmal, (Fall 4 u. 12).

In der Glandula submaxillaris waren reichliche Mengen von Pigment insgesamt 3 mal festzustellen (Fall 1, 4, 8); mäßig viel Pigment (6 mal (Fall 3, 5, 7, 12, 13, 14); nur geringe Pigmentierung 2 mal (Fall 10 und 11).; überhaupt nur Spuren von Pigment in einem Fall (Fall 15).

In der Glandula sublingualis ließ sich reichlich Pigment in 3 Fällen nachweisen (Fall 9, 11 u. 12); mäßig viel Pigment 1 mal (Fall 14); nur geringe Pigmentierung 3 mal (Fall 2, 3, 10).

Die relativ höchsten Grade der Pigmentierung unter den 3 Drüsen wies somit die Glandula submaxillaris auf. An zweiter Stelle steht die Glandula sublingualis, die das Pigment aber doch auch relativ häufig in auffallend großer Masse speichert. In der Parotis, wo sich nur in einem Fall reichlich Pigment auffinden ließ, ist im allgemeinen der Grad der Pigmentierung ein recht geringer, öfters treten nur geringe Anfangsstadien der Pigmentierung in Erscheinung.

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß sowohl bezüglich der Beteiligung als auch der Mengenverhältnisse des Pigmentgehaltes die Submaxillaris prozentual an erster Stelle unter den 3 Drüsen steht. An zweiter Stelle steht die Sublingualis und in einigem Abstand an dritter Stelle die Parotis, wo sich relativ am seltensten und spärlichsten Einlagerung von Pigment gefunden hat.

Yamaguchi (2) gibt in dieser Frage keine einwandfreien Ergebnisse bekannt; er schreibt: „Unter den 3 großen Speicheldrüsen findet man das Pigment am zahlreichsten in der Submaxillaris, während es in der Sublingualis sowie Parotis gering vorkommt. Das umgekehrte Verhältnis kann aber auch bestehen. Was nun die Lokalisation des Pigmentes innerhalb der Speicheldrüsen anlangt, so kommen nach unseren Befunden dafür folgende Zellen in Betracht: 1. Die Epithelien der Ausführungsgänge, 2. die Epithelien der Sekretröhren, 3. die Epithelien der serösen Drüsen, 4. die Epithelien der serösen Halbmonde 5. die Epithelien der mukösen Drüsen.

Es bestehen jedoch starke Unterschiede bezüglich der graduellen Beteiligung der einzelnen Parenchymzellen, und es sind auch gewisse Verschiedenheiten innerhalb der Drüsen selbst erkennbar.

In der Parotis fand sich das Pigment am häufigsten und verhältnismäßig noch am reichlichsten in den Epithelien der Sekretröhren (4 mal in den Epithelien der Sekretröhren in Fall 2, 4, 6, 8). Ebenso häufig aber nicht so reichlich enthielten das Pigment vereinzelt seröse Drüsenepithelien (Fall 2, 6, 8, 12). Die großen Ausführungsgänge sind nie an der Pigmentierung be-

ligt gewesen. Die kubischen Epithelien der Schaltstücke sind insgesamt auch nur selten pigmentiert.

In der Submaxillaris sind die Verhältnisse ähnlich: In den pigmenthaltigen Fällen enthielten die Sekretrohrepithelien stets Pigmenteinlagerungen (12 Fälle), seltener die serösen Drüsen und einzelne seröse Halbmonde, insgesamt 7 Fälle (1, 5, 7, 10, 11, 14)! Nur in einem Fall enthielten Spuren von Pigment die mukösen Drüsenepithelien (Fall 5). Jeweils die größte Menge an Pigment war auch stets in den Sekretrohrepithelien enthalten, weniger in Schaltstücken und nie in Ausführungsgängen.

Etwas anders als in der Parotis und Submaxillaris lagen die Verhältnisse in der Sublingualis. In dieser Drüse werden als Lokalisation der Pigmentierung die serösen Halbmonde entschieden bevorzugt. Zu erklären ist dieser Befund aus der Tatsache, daß die Sublingualis keine Sekretrohren enthält, daß vielmehr die Ausführungsgänge fast unmittelbar in die Endstücke überführen und mit eben die serösen Halbmonde das Pigment enthalten müssen. Typisch ist beispielsweise der folgende Befund für die Sublingualis (Fall 11): reichlich Pigment in serösen Zellen und Halbmonden, nur sehr gering in kleinen Ausführungsgängen. Eine Ausnahme bildet der Fall 10, der überhaupt nur geringe Pigmentierung und zwar lediglich an den kleinen Ausführungsgängen zeigt.

Nicht so häufig und stark wie die serösen Halbmonde sind in der Sublingualis die rein serösen Drüsenepithelien an der Pigmentierung beteiligt, am seltensten die mukösen Drüsen (Fall 11).

Ueber die Pigmentierung der Sekretrohren, von welchen, wie bereits erwähnt, die kleinen häufiger und stärker betroffen sind, ist noch zu sagen, daß das Pigment gelegentlich ausgesprochen lumenwärts gelagert ist. Ganz selten nur war das Pigment an der Zellbasis oder in deren Nähe lokalisiert. Immerhin sind Beispiele darunter, wie beispielsweise die Submaxillaris von Fall 3, in welcher das Pigment teilweise mehr lumenwärts teilweise mehr basal, teilweise anscheinend gleichmäßig über die Zellen verstreut liegt. Dieser Fall zeigt, daß die Pigmentlokalisation innerhalb der Zelle bestimmten Gesetzmäßigkeiten wohl nicht unterworfen ist, dennoch scheint eine gewisse Beziehung des Pigmentes zum Zellkern zu bestehen; soweit nämlich die Zelle nicht in ihrer Gesamtheit mit Pigment erfüllt ist, hat sich meist eine Lagerung des Pigmentes in unmittelbarer Nähe des Kernes beobachten lassen.

Nur teilweise decken sich diese Ergebnisse mit den Ergebnissen Yamaguchis (2). Dieser Autor fand das Pigment durchwegs am häufigsten in den Stäbchenepithelien, worunter er die zylindrischen Epithelien der Sekretrohren verstanden haben

will, —weniger zahlreich in den Ausführungsgangepithelien. A behauptet er das Pigment der Ausführungsgänge regelmäßig m lumenwärts gelagert gesehen zu haben. Uebereinstimmend ihm fand ich starke Affinität des einzelnen Pigmentkörnchens z Zellkerne.

Was die Form des abgelagerten Pigmentes anbelangt, ist hier bemerkenswert, daß die erste mikroskopische Untersuchung der mit Hämatoxylin — Eosin gefärbten Präparate wesentlichen 3 Formen der Pigmentierung in Erscheinung tre läßt.:

1. scheinbar diffuse Verteilung des Farbstoffes.
2. Pigment von der Form mehr oder weniger feiner Kö chen.
3. Pigment in Form grober Körner oder gar Schollen.

Sobald die Zelle nämlich in ihrer Gesamtheit mit Pigme durchsetzt ist, erscheint der Farbstoff in diffuser Verteilung oh scharfe Konturierung. Die weitere Färbung mit Nilblausulfat lö stets das scheinbar diffus verteilte Pigment in sehr viele scha gezeichnete Pigmentkörnchen auf. Auch die grobkörnige For des Pigmentes war meist nach der Färbung mit Nilblausulfat n noch als feinkörnig zu bezeichnen. Und was man zunächst et für Pigmentschollen halten könnte, erweist sich nach der Färbu mit Nilblausulfat als nur vorgetäuscht und zwar bedingt durch e starkes Aneinandergedrängtsein der einzelnen Körnchen, me um den Zellkern herum. Man darf somit wohl behaupten, d sich hinter den verschiedensten Formen (Schollen, grobkörnig Pigment und diffusverteiltes Pigment) anscheinend regelmäßig se feine Pigmentkörnchen verbergen.

Die natürliche Farbe des Pigmentes schwankt zwischen d verschiedensten Nuancen von gelb und braun: blassgelb, zitrone gelb, goldgelb, gelblichbraun, goldbraun bis dunkelbraun.

Das Pigment in den serösen Drüsenepithelien zeigte häu einen etwa blasseren Farbton als das Pigment in den zugehö gen Drüsenausführungsgängen. Es ist nicht wahrscheinlich, da diese Farbunterschiede bedingt sind durch verschiedene Menge verhältnisse; jedenfalls zeigte die Nilblausulfatfärbung, die das Pi ment gleichmäßig dunkelblau färbt, bei dem etwas dunklere Pigment kein stärkeres Gehäuftsein der Pigmentkörnchen als b den blasseren Pigment. Bei dem Pigment der serösen Halbmonc fehlt öfters der sonst beobachtete leuchtende Farbton (Fall 9) es erscheint dann etwas blaß, mehr schmutziggelb bis braun.

Die bei meinen Untersuchungen verwendeten Färbemethode habe ich in der Einleitung zu dieser Arbeit bereits angegeb Es soll nun noch im einzelnen auf das Verhalten des gefundene

Pigmentes diesen Färbemethoden gegenüber eingegangen werden.

Der Versuch, mit Turnbull's-Blaureaktion und Berliner-Blaureaktion einen Farbumschlag des braunen, beziehungsweise gelben Pigmentes hervorzurufen, gelang in keinen Fall. Dieses Ergebnis war der einwandfreie Beweis dafür, daß das Pigment eisenfrei war. Dagegen ließ sich das Pigment stets mit Sudan III und ebenso mit Scharlachrot färben. Es ließ sich von dem übrigen Fettgewebe, das sich gelb färbte, durch einen etwas mehr rötlichen Farbton unterscheiden.

Yamaguchi (2) und Kurosawa (3) behaupteten, das Pigment der Korbzellen sei nur schwer mit Sudan III zu färben. Meine Untersuchungen konnten diese Behauptung nicht bestätigen.

Sehr schöne Ergebnisse erzielte im allgemeinen die Nilblaululfatfärbung, die das Pigment meist tief dunkelblau färbte. Einen etwas anderen Farbton, dunkelblau bis grünlich, rief die Nilblaululfatfärbung gelegentlich an dem Pigment der serösen Halbmonde in der Sublingualis hervor (besonders in Fall 11). Im übrigen verhalf diese Färbung, wie bereits erwähnt und wie auch aus den genauen Protokollen hervorgeht, stets dazu, das Pigment in seiner eigentlichen Form zu erkennen, nämlich in feinen Körnchen.

Ich machte weiter den Versuch durch 3%iges Hydrogenium peroxydatum bei 24stündiger Einwirkung das Pigment zum Schwinden zu bringen. Dies gelang nur in den seltensten Fällen. Das Pigment blaßte lediglich in seiner Farbe etwas ab.

Yamaguchi (2) schreibt über die Wirkung von Hydrogenium peroxydatum „wenn man käufliche Wasserstoffsuperoxydlösung lange Zeit darauf einwirken läßt, so kann es gebleicht werden“. Nach der Tabelle von Werner Hueck (8), die einen Überblick gibt über das mikrochemische Verhalten der verschiedenen Pigmentgruppen, soll dieses gelbe Pigment durch 3%ige Wasserstoffsuperoxydlösung gebleicht werden. Eine bestimmte Gesetzmäßigkeit im Verhalten des eisenfreien braunen Pigmentes dem Hydrogenium peroxydatum gegenüber scheint also nicht zu bestehen.

Außerdem versuchte ich durch Argentinum nitricum eine Schwärzung des Pigmentes hervorzurufen. Dieser Versuch gelang in keinem der Fälle. Häufig glaubte man wohl lediglich eine leichte Nachdunklung des Pigmentes feststellen zu können, doch ist die sichere Entscheidung hierüber schwierig, da mit Arg. nitr. der ganze Schnitt leicht gebräunt wird und man nur schwer sagen kann, ob das Pigment relativ mehr als das Parenchym verdunkelt sei.

Gestützt auf die Pigmentuntersuchungen von Werner Hueck (8) einerseits und von Brahn und Martha Schmidt mann (10) andererseits komme ich zu dem Schluß, das gefundene Pigment für Abnutzungspigment zu halten.

Nachdem durch den negativen Ausfall der Eisenreaktion das Pigment nicht als Hämosiderin gekennzeichnet war, blieb nach der Art des Auftretens, Form und Farbe und schließlich nach den begleitenden Umständen in diesen Fällen zu schließen nur die Möglichkeit, das Pigment unter die Gruppe der anhaemoglobinogenen Pigmente unterzuordnen und zwar entweder zu den autochthonen melanotischen Pigmenten oder aber zu dem Abnutzungspigment; diese beide Pigmentarten stehen nach den neuen Untersuchungen der Schule Lubarsch ja einander sehr nahe und sind vielleicht sogar als einheitlich zu bewerten.

Unsere Untersuchungen ergaben eine unverkennbare Bindung des Pigmentes an Fettsubstanz. Dies bewiesen die Reaktionen mit Nilblausulfat, mit Sudan III und mit Scharlachrot. Ein derartiges Verhalten ist charakteristisch für das Abnutzungspigment. Es muß sich somit bei dem eisenfreien braunen Pigment, das wir in den Speicheldrüsen fanden, wohl um Abnutzungspigment handeln.

Es verdient außerdem noch die Frage Beachtung, ob Beziehungen zwischen Pigmenteinlagerung einerseits und erkennbaren atrophischen Veränderungen am Drüsenparenchym andererseits vorhanden sind.

Gewisse Parallelen bestehen hier zweifelsohne. In den 15 untersuchten pigmenthaltigen Fällen war mit Ausnahme von Fall 12 und 13 stets Atrophie am Parenchym vorhanden. Diese Tatsache möchte die Vermutung nahe legen, daß die Atrophie als das ursächliche Moment der Pigmentierung zu betrachten ist. Es sprechen jedoch gewisse Beobachtungen gegen diese Annahme. Die genaue mikroskopische Untersuchung hat nämlich ergeben, daß mit Fällen von hochgradiger Atrophie nicht immer eine graduelle Steigerung der Pigmentierung einherging, daß häufig die eine Veränderung hochgradig war, während die andere, wenn überhaupt, so doch nur geringgradig vorlag. So finden wir beispielsweise in den beiden untersuchten Drüsen des Falles 9 folgende Verhältnisse: In der Parotis (9) ist das Parenchym stark atrophisch, Pigment nicht sicher nachweisbar, dagegen in der Sublingualis (9) nur geringe Atrophie des Drüsenparenchyms bei reichlichem Pigmentgehalt der serösen Zellen, besonders der Halbmonde. Der Fall 11 ließ am Drüsengewebe der Glandula sublingualis (11) keine atrophischen Veränderungen erkennen, dagegen konnte man in der gleichen Drüse recht reichlich Pigment in se-

ösen Zellen und Halbmonden sowie mukösen Drüsen beobachten. Auch aus den Befunden des Falles 12 lassen sich starke Beweisgründe gegen eine Annahme einer gegenseitigen Bedingtheit von Atrophie und Auftreten von Abnutzungspigment hervorheben. Die untersuchte Parotis dieses Falles ließ atrophische Veränderungen überhaupt vermissen, dagegen fand sich Pigment in Spuren in dieser Drüse, nämlich in vereinzelter serösen Drüsen. Die Glandula submaxillaris des gleichen Falles wies ebenfalls keine Atrophie am Drüsengewebe auf, dagegen fand sich häufig viel Pigment in den Epithelien der Sekretröhren und etwas Pigment in serösen Drüsenepithelien. Und gar die Glandula sublingualis dieses Falles, die wieder ohne Atrophie war, ließ sogar deutlich Pigment erkennen, nämlich in serösen Zellen und Halbmonden.

Dieses inkonstante Vorkommen von Pigment bei Atrophie am Drüsengewebe spricht sehr dagegen, daß die Atrophie als eigentlich ursächliches Moment der Pigmentierung anzusehen ist. Es besteht lediglich eine häufige Kombination der beiden Vorgänge bei den gleichen Veränderungen, die den Gesamtorganismus beherrschen.

Im übrigen decken sich diese Befunde an den Speicheldrüsen sehr mit den Befunden, welche E. Kirch (4) am braun-atrophischen Herzen erhob: „Von vorneherein muß aber betont werden, worauf auch Mönckeberg hinwies, daß Atrophie und Pigmentierung des Herzens zwar in der Regel zusammen auftreten, aber doch zwei getrennte Vorgänge sind, die sich nicht gegenseitig bedingen; es kommen Pigmentierungen ohne alle nachweisbare Atrophie vor und andererseits Atrophie ohne alle Spur von Pigment.“

Unter welchen Bedingungen kommt es nun überhaupt in den Speicheldrüsen zur Bildung des braunen Abnutzungspigmentes?

Unverkennbar ist ein gehäuftes Auftreten des Pigmentes bei Individuen höheren Lebensalters. Die von mir gefundenen und untersuchten 27 pigmenthaltigen Speicheldrüsen von insgesamt 55 einzelnen Fällen stammen mit nur wenigen Ausnahmen aus dem Senium beziehungsweise dem Peaesenum. Das Auftreten von braunem Pigment, meist kombiniert mit Atrophie des Drüsengewebes, ist in der Speicheldrüse sicherlich ebenso gut als eine Altersveränderung anzusehen, wie beispielsweise die braune Atrophie des Herzens. Es besteht nur ein Unterschied in der Altersgrenze, soweit das aus dem verhältnismäßig kleinen Material, das mir zur Verfügung stand, zu übersehen ist, insofern, als das Abnutzungspigment im Herzen in noch früherem Lebensalter

auftritt als in der Speicheldrüse. Die eingehenden Untersuchungen E. Kirch (4) über die Pathologie des Herzens haben ergeben, daß man an den Herzen an sich gesunder Menschen das braune Abnutzungspigment bereits jenseits des 20. Lebensjahres niemals vermißt.

Ich habe gleichzeitig mit meinen Untersuchungen an den Speicheldrüsen aus den Sektionsprotokollen der betreffenden Individuen den mikroskopischen Befund an Herz und Leber entnommen.

In 4 Fällen hatte die mikroskopische Untersuchung des Herzens reichlich Abnutzungspigment ergeben (Fall 3, 5, 8, 11). In diesen Fällen fand sich stets auch mäßig bis reichlich Pigment in den Speicheldrüsen. In den übrigen Fällen ist die mikroskopische Sicherstellung des Pigmentes in Herz beziehungsweise Leber gar nicht nötig gewesen, da bereits die makroskopische Untersuchung eine braune Atrophie von Herz und Leber ergeben hatte.

Außerdem spielen für die Entstehung des Abnutzungspigmentes in den Speicheldrüsen eine große Rolle gewisse Krankheiten. Zweifelsohne findet sich das braune Abnutzungspigment gehäuft bei malignen Tumoren, die laut Sektionsprotokoll meist mit Tumorkachexie einhergingen. (Fall 7, 10, 11, 14.) Der Ernährungszustand in diesen Fällen war öfters sehr schlecht beziehungsweise stark reduziert. Nur bei Fall 2 und 3 (Fall 2: Rektumcarzinom, Fall 3: Magencarzinom) in welchen Fällen wir Abnutzungspigment in den Speicheldrüsen gefunden hatten, war ausnahmsweise der Ernährungszustand mit gut bezeichnet. In den übrigen Fällen waren als Hauptleiden und Todesursache Erkrankungen wie Peritoneal-Tuberkulose, Blasenpappilomatose, Peritonitis, Dünndarmfistel, Diabetes und andere schwere Erkrankungen protokolliert. Auch in diesen Fällen war der Ernährungszustand der einzelnen Verstorbenen sehr schlecht bis mäßig. Eine Ausnahme bildete eigentlich nur der Fall 1, in dem das Hauptleiden in einer blanden Nephrosklerose bestand. In diesem Fall war der Ernährungszustand mit sehr gut bezeichnet. Wir fanden in der untersuchten Glandula submaxillaris (Fall 1) reichlich Pigment.

Jedoch kann man zusammenfassend wohl behaupten, daß an den Speicheldrüsen die gleichen Allgemeinerkrankungen zur Bildung von Abnutzungspigment führten, wie an Herz und Leber, nämlich senile oder aber marantische Atrophie des Gesamtorganismus.

Zusammenfassung.

Wie die vorliegenden histologisch-mikrochemischen Untersuchungen an den 27 Speicheldrüsen von 8 Männern und Frauen aus dem höheren und höchsten Lebensalter ergeben haben, finden sich in den drei großen Mundspeicheldrüsen Parotis, Submaxillaris und Sublingualis recht häufig Einlagerungen in eisenfreiem braunen Pigment (Abnutzungspigment).

Von rund 50 untersuchten Fällen, mit Bevorzugung des höheren Lebensalters fand sich das Pigment einwandfrei in 15 der Fälle, d. h. in fast einem Drittel des Gesamtmaterials.

Im einzelnen ergaben die Untersuchungen gewisse Eigenlichkeiten bezüglich der Verteilung des Pigmentes auf die drei Drüsen. Es zeigt sich nämlich, daß die Glandula submaxillaris unter den zur Verfügung stehenden Drüsen relativ am häufigsten und in reichster Menge das braune Abnutzungspigment enthielt, ferner daß die Glandula sublingualis bezüglich ihrer Beteiligung an der Pigmentierung der Glandula submaxillaris gegenüber etwas zurückstand und außerdem, daß die Glandula parotis am seltensten und in geringster Menge das Pigment enthielt.

Eine gewisse Gesetzmäßigkeit ergab sich für die Lokalisation des Pigmentes in den Speicheldrüsen insofern, als in Submaxillaris und Parotis stets die Epithelien der Sekrettröhen am häufigsten und in reichster Menge das Pigment enthielten. Gelegentlich auch die Schaltstücke. Seltener und in wesentlich geringerem Grade waren in Parotis und Submaxillaris die serösen Drüsenepithelien pigmentiert. In den mukösen Drüsenepithelien der Submaxillaris fand sich dieses Pigment überhaupt nur sehr spärlich und ganz selten.

In einem Gegensatz zu Parotis und Submaxillaris stand die Sublingualis, die als hauptsächlichste und häufigste Lokalisation der serösen Halbmonde aufwies, und demgegenüber die Pigmentierung der Ausführungsgänge, der serösen Drüsen und der mukösen Drüsen weit zurücktreten ließ.

Muköse Drüsenzellen sind insgesamt am seltensten und geringfügigsten pigmentiert.

Das in seiner Farbe zwischen blaßgelb und dunkel-braun wechselnde feinkörnige Pigment zeigte auch stets in seiner geringen Affinität zum Zellkern.

Wenn Autoren wie Yamaguchi (2) behaupteten an dem Pigment der Sekretröhren deutliche Lagerung mehr lumenwärts erkannt zu haben, so läßt sich durch unsere Untersuchungen diese Beobachtung nicht bestätigen. Das Pigment unserer Fälle zeigte keine regelmäßige Bevorzugung der Lage in den dem Lumen zugewandten Partien der Sekretröhren.

Außerdem bewiesen die Untersuchungen, daß das braune Abnutzungspigment in den Speicheldrüsen unter ähnlichen Verhältnissen wie etwa in Herz und Leber gebildet wird, nämlich besonders häufig in höherem Lebensalter und bei Allgemeinerkrankungen wie malignen Tumoren, Tuberkulose, Diabetes, Peritonitis und anderen, die einhergehen mit Unterernährung und Kachexie. Ferner konnten die Untersuchungen beweisen, daß bei Auftreten von Abnutzungspigment in Speicheldrüsen in den gleichen Fällen auch stets an Herz und Leber eine braune Atrophie, also ebenfalls braunes Abnutzungspigment vorhanden ist.

Es ergaben sich für die Speicheldrüsen auch die gleichen Tatsachen wie für das braun atrophische Herz: daß die Bildung von Abnutzungspigment nicht bedingt sein kann durch die Atrophie des Gewebes, in welchem das Pigment gefunden wird.

Literaturverzeichnis.

- . Bork: Zur Lehre von der allg. Hämochromatose.
Virch. Arch. 269, 178, (1928).
- rahn-Schmidtman: Zur Pigmentfrage. Centralbl. f. Path. 33/1922/23.
- . Hintze: Ueber Hämochromatose. Virch. Arch. 139, 459, (1895)
- . Hueck: Die pathologische Pigmentierung. Handb. d. allg. Path.: Krehl
und Marchand 3. Bd. II. Abtlg.
- . Kirch: Pathologie des Herzens. 1. Teil Ergebnisse der Allg. Path. u.
Patholog-Anatomie des Menschen und der Tiere.
XXII. Jahrgang 1. Abt.
- urosawa: Studien über die Mundspeicheldrüsen! Transactions of the Ja-
panese pathological society Volum XII (1922)
- . J. Lang; Pathologische Anatomie der großen Kopfspeicheldrüsen im
Henke-Lubarsch. Handbuch der spez. Anat. u. Histo-
logie Bd. V/2 (1929)
- Quincke: zit. nach Lang (1)
- . Schmidtman: Zur Kenntnis des braunen Pigmentes von Leber und
Herz. Centralbl. f. Path. 29/1918.
- olger: Ueber den feineren Bau der Glandula submaxillaris usw. Fest-
schrift zum 70. Geburtstag von C. Gegenbaur 2 (1896.)
- amaguchi: Studien über die Mundspeicheldrüsen. Zieglers Beitr. zur
pathol.-Anatomie 73 (1925)
-

Lebenslauf.

Ich, Thea Schmidt, Tochter des Reichsbahninspektors Adolf Schmidt und seiner Ehefrau Käthe, bin geboren am 23. April 1907 in Nürnberg. Mit 6 Jahren trat ich in die Volksschule ein. Nach 4jährigem Besuch trat ich in das Lyceum des Instituts Lohmann in Nürnberg über, nach weiteren 3 Jahren in das Mädchenrealgymnasium Nürnberg. An letztgenannter Schule legte ich 1927 die Reifeprüfung ab. Im Sommersemester des gleichen Jahres immatriculierte ich mich an der Universität Erlangen um mich dem Studium der Zahnheilkunde zu widmen. Nach 3 Semestern bestand ich die zahnärztliche Vorprüfung. Im November 1930 erlangte ich durch Ablegung des zahnärztlichen Staatsexamens die Approbation als Zahnärztin. Meine gesamte Studienzeit verbrachte ich an der Universität Erlangen. Mein 8. Semester war ausschließlich der Arbeit an meiner Dissertation gewidmet.

Zu ganz besonderem Dank bin ich Herrn Universitäts-Professor Dr. Eugen Kirch verpflichtet der die Anregung zu vorliegender Arbeit gab und der mir bei der Verwertung des zur Verfügung stehenden Materials und seiner Verarbeitung in äußerst lebenswürdiger Weise mit Rat und Tat zur Seite stand.

Nummer	Geschlecht	Alter	Sektions-Nr.	Hauptleiden und Todesursache	Ernährungs-zustand	Parotis	Submaxillaris	Sublingualis	Abnutzungspigment in Herz und Leber	Pigmenteinlagerung			Atrophie		
										Parotis	Sub.-Max.	Sub.-Ling.	Parotis	Sub.-Max.	Sub.-Ling.
1	W.	69	205/30	Blande Mephrosklerose. Hypertrophie und Dilatation des linken Herzens. Ausgedehnte und starke Arteriosklerose; frischer Hirnerweichungsherd in dem rechten Stammganglion.	sehr gut		+		Myocard blaßbraun. Keine mikroskop. Untersuchung.		reichlich Pigm. in Sekrettröhren, geringer in serösen Drüsen; nicht in mukösen Drüsen.			geringe A. an Drüsenepith. u. Ausführungsgängen.	
2	W.	72	191/30	Rectum-ca; Herzinsuffizienz. Mäßig starke Atherosklerose der Aorta.	gut	+		+	Myocard blaßbraun. Keine mikroskop. Untersuchung.	einzelne seröse Drüsen gering pigmentiert, mehr u. deutl. die Sekrettröhren u. Schaltstücke.		einzelne seröse Drüsen und Halbmonde deutlich aber geringgradig pigmentiert.	mittlere bis hochgr. A. der serösen Drüsenepithelien.		Keine deutliche A. an Drüsenepithelien.
3	W.	67	196/30	Magen-ca mit Metastasen. Mäßig starke Aortensklerose. Kachexie.	gut		+	+	Myocard blaßbraun. Mikr. Herz reichlich Abnutzungspigm.		mäßig viel braunes Pigm. in Sekrettröhren und einzelnen Schaltstücken.	braunes Pigm. in vereinzelt serösen Halbmonden.		Drüsenparenchym geringgr. atrophisch.	Drüsenparenchym meist nur wenig atrophisch, selten mittelgradig.
4	W.	71	182/30	Diabetes. Mäßig starke Arteriosklerose. Herzdilatation. Lungenödem.	reduziert	+	+		Myocard braun. Keine mikroskop. Untersuchung.	nicht deutlich in Sekrettröhren.	br. Pigm. durchwegs in Sekrettröhren, weniger in Schaltstücken.		Drüsenparenchym geringgradig atrophisch.	Geringe A. an Drüsenepithelien und Epithelien der Ausführungsgänge.	
5	W.	74	184/30	Alte Peritonitis. Dünndarmfistel. Marasmus. Mäßig starke Atherosklerose an der Aorta und den Coronararterien.	stark reduziert		+		Myocard stark braun. Mikr. Herz reichlich braunes Pigm.		mäßig Pigm. in Sekrettröhren, weniger in serösen Zellen. Spuren in mukösen Drüsen.			mittelgradige A. des Drüsenparenchyms.	
6	W.	82	155/30	Arterio- und arteriosklerot. Schrumpfniere. Starke Herzhypertrophie. Ausgedehnte und starke Arteriosklerose. Bronchopneumonie. Marasmus senilis.	stark reduziert	+			Myocard braunrot. Keine mikroskop. Untersuchung.	geringe Pigm. in Sekrettröhren. Sehr wenig in einzelnen serösen Drüsen.			deutliche mittelgr. A. des Drüsengewebes.		
7	M.	71	62/30	Magen-ca mit Metastasen. Marasmus.	sehr schlecht		+		Myocard braun. Keine mikroskop. Untersuchung.		mäßig Pigm. in Sekrettröhren. Spuren in einzelnen serösen Drüsen.			seröse Epithelien deutl. atrophisch.	
8	M.	75	68/30	Periproktale Phlegmone. Ausgebreitete Arteriosklerose von wechselnder Stärke. Geringe arterio- und arteriosklerotische Schrumpfniere. Keine sichere Herzhypertrophie. Marasmus.	mittel	+	+	+	Myocard braun. Mikr. Herz reichlich braunes Pigm.	reichlich Pigm. in Sekrettröhren. Sehr gering in serösen Drüsen.	braunes Pigm. nur in Sekrettröhren deutlich.	Pigm. nicht sicher.	mittelgradige A. des Drüsengewebes.	seröse Drüsen etwas atrophisch.	vorwiegend seröse Drüsen geringgr. atrophisch.
9	W.	71	114/30	Diabetes. Duraendotheliom über dem linken Stirnhirn. Geringe Atheromatose von Aorta- Coronar- und Hirngefäßen. Geringe recurrierende Mitral- und Aortenendocarditis.	sehr fettreich	+		+	Myocard braun. Keine mikroskop. Untersuchung.	Pig. nicht sicher.		ziemlich reichlich blaßbraunes Pigm. in serösen Zellen, besonders in Halbm.	Parenchym stark atrophisch.		Drüsengewebe etwas atrophisch.
10	M.	75	112/30	Pankreas-ca mit Metastasen. Tumorkachexie. Atrophisches Herz. Geringe Altersatrophie von Milz und Nieren.	schlecht		+	+	Braunatrophisches Herz. Keine mikr. Untersuchung.		geringe Pigm. der serösen Halbmonde. Spuren in Sekrettröhren.	geringe br. Pigm. der kl. Ausführungsgänge		Parenchym geringgr. atrophisch.	keine deutliche A. d. Parenchyms.
11	M.	46	211/30	Kehlkopf-ca. Erstickungstod durch Larynxödem. Mäßig starke Stauungsorgane. Alte abgeheilte Spitzentbc.	mittel	+	+		Mikr. Herz reichlich Abnutzungspigm.		Pigm. in ganz wenig serösen Drüsen. Sekrettröhren nicht deutlich.	Recht reichlich Pigm. in serösen Zellen und Halbmonden und mukösen Drüsen. Sehr gering in klein. Ausführungsgänge.		keine A.	keine A.
12	M.	54	154/30	Hochgradige Peritonealtbc. Allgemeine Atherosklerose des Gefäßsystems. Chron. Leptomeningitis. Hirnödem.	mäßig	+	+	+	Braune Atrophie an Herz und Leber.	Spuren in vereinzelt serösen Drüsen.	in Sekrettröhren und Schaltstücken mäßig wenig Pigm. in serösen Drüsen.	reichlich in serösen Halbmonden, nicht so reichlich in rein serösen Drüsen.	keine A.	keine A.	keine A.
13	M.	65	253/30	Blasenpapillomatose. Dilatation des linken Herzens. Lungenödem.	gut		+		Myocard blaßbraun. Keine mikroskop. Untersuchung!		mäßig Pigm. in Sekrettröhren.			nicht deutlich am sezernierend. Epithel, wenn überhaupt.	
14	M.	78	222/30	Polymorphkerniges Sarkom der rechten Gesichtshälfte von der Nase ausgehend, mit Metastasen. Herz- und Kreislaufinsuffizienz. Kachexi. Altersatrophie an Leber und Nieren.	mittel	+	+	+	Braune Atrophie der Leber.		mäßig Pigm. in Sekrettröhren, weniger in serösen Drüsen.	im ganzen nicht sehr viel in Halbmonden und in kl. Ausführungsgängen.	Parenchym mäßig atrophisch	Parenchym mäßig atrophisch.	keine A.
15	M.	67	232/30	Chronisches Lungenödem bei Mitralinsuffizienz. Konfluierende Bronchopneumonie rechts mit Pleuritis fibrinosa. Braune Atrophie des Herzens. Senile Atrophie der Nieren.	kachektisch		+		Braune Atrophie des Herzens!		Sehr spärlich in Sekrettröhren.			geringe bis mittelgr. A. des Parenchyms.	

